

PREPARATBEGRÄNSNINGAR

Preparat	Vind- avdrifts- redu- cering	Bi- farligt	Preparat- påfyllare	Tät hytt och kolfilter- insats	Begrän- sad halm- hantering
Amistar / Quadris	50 & 90 % (1)+(2)				
Ariane S				Ja	Ja (se etikett)
Ascra			Ja	Ja	
Banjo				Ja	
Basagran SG			Ja		
Botiga			Ja		
Boxer / Purelo	OBS			Ja	
Caryx			Ja		
Cerone			Ja		
Cliophar fr 250125					Ja (se etikett)
Danitron	99 % (2)	Ja			
Delan WG / Pro	90 % (2)				
Duplosan Max & D			Ja		
Elatus Era			Ja		
Elatus Plus	50 % (2)		Ja		
Fenix	50 % (2) & (5)				
Fibro	50 % (2)	Ja (7)			
Flurostar XL			Ja		
Folicur Xpert	50 % (2)				
Forapro	90 % (2)		Ja		
Goltix WG				Ja	

PREPARATBEGRÄNSNINGAR forts

Preparat	Vind- avdrifts- redu- cering	Bi- farligt	Preparat- påfyllare	Tät hytt och kolfilter- insats	Begrän- sad halm- hantering
Gratil / Eagle	50 % (3)				
Hussar Plus OD	50 % (2)		Ja		
Leander	75 % (2) & (6)		Ja		
Matrigon					Ja (se etikett)
Mavrik	Ja (se etikett)				
Milbek- nock		Ja (4)			
Mizuki	50 % (9)		Ja		
Mospilan	50 % (8)				
Nexide CS	50 % (2)	Ja			
Onyx	50 % (2) & (10)				
Raptol	75 & 50 % (5)	Ja			
Revytrex			Ja		
Signum	25 % (2)				
Shirlan / Kunshi				Ja	
Stabilan 400					Ja (11)
Syllit			Ja		
Talius			Ja		
Teppeki		Ja			
Toma- hawk 200			Ja		
Tombo				Ja	Ja (se etikett)
Univoq	75 % (2)		Ja		

PREPARATBEGRÄNSNINGAR forts

- (1) = 50 % vid gräsfrö till utsäde. Vid tunnel och frilandsodling av barrträdplantor dos <0,4=50 %, om dos >0,4=90 %
- (2) = Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
- (3) = Gäller bete och slåttervall samt gräsfrö till utsäde.
- (4) = Gäller i växthus.
- (5) = Olika på olika grödor samt om bom eller fläktspruta. Se etikett.
- (6) = Endast vid dos >0,35 liter/ha.
- (7) = Gäller endast bär och plantskoleväxter på friland.
Spruta ej i blommande gröda och sprutning helst nattetid.
- (8) = Endast i prydnadsväxter i fält.
- (9) = Om två behandlingar och/eller dos över 1 liter, vid behandling närmare än 100 m från fältkant.
- (10) = Endast vid dos över 0,5 liter/ha.
- (11) = Halmen får inte användas i svampproduktion.

OBS! För Boxer vid användning på hösten finns flera begränsningar.

- 1: Produkten får inte spridas närmare än 500 m från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga växtdelar ovan jord avsedda för humankonsumtion. Alltså i första hand frukt och grönsaker.**
- 2: Spridning skall göras mellan kl 18 och kl 03.**
- 3: Lufttemperaturen får vara högst 15 grader vid spridning.**
- 4: Fordonet skall ha tät förarhytt med ventilation som har partikel och kolfilter.**
- 5: Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften med minst 90 % skall användas**
- 6: Körhastigheten vid spridning får maximalt vara 8 km/h.**

Bigiftig: Preparat som anses vara bigiftiga. Skall noteras i sprutjournalen om det finns blommor i fält.

Fast skyddszon: En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Zonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. Skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

PREPARATBEGRÄNSNINGAR forts

Påfyllningsutrustning: Ska preparatssluss/påfyllare, sugspjut eller motsvarande användas.

Tät hytt: Tät ventilerad hytt med partikel- och kolfilterinsats krävs.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Minsta skyddsavstånd på mark vid bekämpning:

- 2 m Öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
- 6 m Sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
- 12 m Dricksvattenbrunnar

Skyddsavstånd vid plats för påfyllning, blandning eller spädning samt yttre rengöring av sprutan.

- 30 m Utomhus till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant, samt till dricksvattenbrunnar.
- 15 m Som ovan om **biobädd** eller **platta med uppsamlingsbrunn** används.